

Lane Medical Library

Wirkung des Blitzes auf den menschlichen Organismus.

Inaugural-Dissertation

zur

Erwerbung der Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie,

welche

mit Genehmigung der hohen medicinischen Fakultät

der

vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

zugleich mit den Thesen

Donnerstag, den 16. November 1893, Mittags 12 Uhr

öffentlich vertheidigen wird

Maximilian Plothe

aus Schwerin a. Warthe.

Referent: Herr Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Hitzig.

Opponenten:

Herr Drs. med. M. Mühr.

Herr cand. med. M. Kahleyss.



Halle a. S.,
Hofbuchdruckerei von C. A. Kaemmerer & Co.
1893.

Imprimatur
Prof. Dr. von Bramann

h. t. Decanus.

Seinen lieben Eltern
in Dankbarkeit

gewidmet.





Digitized by the Internet Archive
in 2026

Vieles, was heute noch über Blitzschlag und dergleichen Unglücksfälle berichtet wird, gehört in das Reich der Märchen. Die Furcht und Aufregung während des Gewitters, das Plötzliche und Gewaltige des Blitzes, thut im Verein mit der Sucht zu übertreiben, ihr Bestreben, um die nackten Thatsachen zu verschleiern.

So ist es denn begreiflich, dass eine sachgemäße Behandlung der durch Blitz verursachten Unfälle überaus schwierig ist, zumal die sich entwickelnden Krankheitsbilder der variabelsten Natur sind. Bedenkt man ferner, dass der menschliche Organismus in seinen einzelnen Teilen erst mannigfach auf derartig kompliziert wirkende Ereignisse zu reagieren imstande ist, so wird uns das Gesagte noch begreiflicher erscheinen.

Zweck nachfolgender Arbeit soll es nun sein, inwiefern die Allgemeinwirkung des Blitzes auf den Organismus zu schildern und dann an der Hand einzelner Krankheitsfälle, insbesondere eines selbst beobachteten Falles dieser Art darzuthun, dass der Blitz analog den Eisenbahnunfällen und ähnlichen Traumata die verschiedensten Bilder der traumatischen Neurose und namentlich der hysterischen Hysterie hervorrufen kann.

Bevor ich jedoch auf diesen Gegenstand eingehe, möchte es gestattet sein, schon zur Erklärung einiger Krankheitserscheinungen einiges über die physikalischen Erregungsformen einzufügen.

Was zunächst die Blitzarten anlangt, so ist schlängelte Linien- und der weit ausgedehnte Flä von altersher bekannt. Eine dritte Form, die v mässig nur selten vorzukommen scheint, aber sicher und auch von Physikern, namentlich französischer obachtet ist, bilden die Feuerkugeln. Wegen ihr heit und der eigentümlich langsamen Fortbeweg sternschnuppenartig Sekunden in Anspruch nimm Vorkommen vielfach geleugnet worden. Bei a Formen des Blitzes haben wir es mit einem Elel ausgleich von Wolke zur Wolke oder von Wolke zu thun.

In letzterem Falle, der hier nur in Betracht gleicht sich die Elektrizität der Wolke — mag s oder negativ sein — mit der entgegengesetzten der Erde aus. Steht eine negativ geladene Wo einer beliebigen Stelle der Erde, so sammelt dieser Stelle positive Elektrizität an, die negat nach allen Seiten hin abgestossen, es entsteht eine Spannung zwischen Wolke und Erdoberfläche. sich nun diese Spannung, so dass sie einen äusser Grad erreicht, so kommt es zum Ausgleich, z nannten Blitzschlag. Darauf strömt die vorher ab negative Elektrizität wieder zurück, es stellt sich Gleichgewicht im Boden wieder her, und inde Vorgang sich vollzieht, haben wir es mit einem Rück zu thun.

Wir sehen also, bei jedem Blitzschlag s Momente zu berücksichtigen; der ungemein sta gleich zwischen Wolke und Erde und dadurch hervorgerufen der Ausgleich auf der Erdoberfläc

Die Wirkung ist in beiden unmittelbar auf folgenden Momenten im Principe dieselbe. In de keit und damit in ihrer Folgeschwere für den Or sind dagegen beide von einander sehr verschieden soll aber nicht gesagt sein, dass der Rücksch

umstände sei, die heftigsten Läsionen beim Menschen hervorzubringen. Wie stark er wirken kann, zeigt uns ein von Charcot berichteter Fall¹⁾, auf den ich hier eingehen will, von dem ich aber weiter unten noch mehr zu sprechen werde. Brandwunden, überhaupt Blitzschläge sind jedoch der Natur des Vorganges gemäss beim Blitzschlag niemals zu beobachten.

Wird nun jemand von einem Blitz unmittelbar betroffen, das heisst, gleicht sich die Elektrizität von Wolke zur Erde direkt durch den Körper aus, ohne dass vorher ein anderer Gegenstand wie ein Haus oder Baum gleichsam Schaltglied bildet, das dann in der Regel wegen seiner schlechten Leitungsfähigkeit zerlegend auf den Strom wirkt, so ist der tötliche Ausgang gewiss. Doch sind auch ohne sichtbare Verletzungen, wie sie etwa weniger gute Leiter erleiden, abgesehen von Brandspuren noch niemals Verletzungen beobachtet worden. Weiter wird es dann bei Blitzunfällen vom Durchmesser und der Stärke des Entladungses abhängig, in welchem Umkreise ein direkter Effekt beobachtet wird. Wir sehen Fälle, wo 1, 2, ja 4 und noch mehr Menschen auf der Stelle getötet werden, während dicht daneben befindliche nur an einzelnen Körperstellen verletzt, andere betäubt, und noch andere gar unbeschädigt werden. Ein derartiges Vorkommnis teilt Reussner²⁾ mit. Von 20 unter einem Leinewandszelt versammelten Personen wurden 4 sofort getötet, die übrigen waren betäubt und nur zum ganz kleinen Teil geringfügig verletzt. „Einer hatte die Empfindung beim Umsinken, als ob er zerrissen würde, ein anderer verspürte einen Schlag wie von einem dicken Pfahle im Genick, ein dritter empfand solchen wie von einem schweren Hammerschlag.“ Schon anders liegen die Verhältnisse, wenn der Blitz

¹⁾ J. M. Charcot: Accidents nerveux provoqués par la foudre. Leçons faites à la Salpêtrière, Paris 1889 Seite 435.

²⁾ Bericht über die Naturforscher-Versammlung zu Magdeburg. Deutsches Centralblatt 1884 S. 503.

in einen schlechten Leiter fährt, dann splittern und teilen, somit schwächeren Strömen in die Erde auf diesem Wege auf Personen übergeht. Hierbei selten Todesfälle vor. Meistens sind die Zuckungen schon zu schwach, um sofort zu töten. Immerhin oft noch stark genug, um recht bedeutende Verletzungen zu setzen.

Ein derartiger Fall ist im Juni 1893 in der Klinik des Herrn Geheimrat Prof. Dr. Hitzig beobachtet gekommen. Ein Blitz, den nebenbei ein glaubwürdiger Augenzeuge im Zickzack hernahe sah, war durch den Schornstein eines Hauses in das Stockwerk gelangt, hatte dort Spuren an der Wand hinterlassen, den Ofen, sowie eine neben diesem hängende Lampe zertrümmert und war dann durch die Balken in das Erdgeschoss, wahrscheinlich in 4 Strahlen — wie durch die Löcher in der Decke hervorging — gedrungen. Es wurde der Ofen beschädigt und ein in die Ofenwand eingeschlagener Nagel herausgerissen. In dem Raum des Erdgeschosses befanden sich 6 Personen. Keine wurde getötet, und nur zwei, die sich in unmittelbarer Nähe des Ofens aufhielten, wurden verletzt. Die eine von diesen beiden erlitt sehr schwere Verletzungen, so interessante Störungen, dass im Laufe der nächsten Tage noch ganz ausführlich darüber berichtet werden wird. Die andere, welche auf einer Bank sass, wurde linksseitig am Kopf verletzt. Der Blitzstrahl setzte an der linken Seite des Kopfes an, schmolz hier zwei im Haar steckende Nadeln zusammen, versengte das benachbarte Haar und hinterliess deutliche Spuren über Brust und Rücken zum Sitzbeinhöcker. Hier verliess er den Körper. Der Stahl war in seiner ganzen Stärke nicht durch den Körper hindurchgegangen, ein Teil hatte ein kleines Mädchen übergegriffen, das sich an der Person angeschmiegt hatte. Baumartig auf dem Rücken verbreitete tiefe Brandwunden zeigten, welche

Strahl besessen haben muss. Während dieses kleine Licht betäubt wurde und abgesehen von den Brandwunden über nichts weiter klagte, verlor erstere, wie schon oben das Bewusstsein. Nach dem Erwachen verspürte sie ein heftiges Zucken, namentlich in der linken, direkt betroffenen, unteren Extremität. Dieser Zuckreiz dauerte nur kurze Zeit. Später blieb nur eine Art Taubheit und Mattigkeitsgefühl in den Beinen zurück. Am 1. Juli verlor sich auch dies und schon Ende Juni, also 4 Wochen nach dem Unglücksfall ging sie ihrer gewöhnlichen Arbeit auf dem Felde nach. Eine vierte Person, welche inmitten des Wohnraumes befand, wurde von einem durch die Wand gerissenen Nagel am Arm getroffen und erhielt noch einen kaum nennenswerten Brandfleck.

Die fünfte und sechste Person, 2 Knaben, standen ebenfalls in der Nähe und erlitten je einen kleinen unbedeutenden Brandfleck oberhalb eines Handgelenkes.

Nachdem wir in oberflächlichen Zügen die nächsten Folgen der Blitzschläge geschildert und gezeigt haben, wie verschiedenartig die Wirkung in den einzelnen Fällen dem Grade nach verschieden sein können, dürfte wohl angebracht sein, kurz darzulegen, wie wir uns diese Mannigfaltigkeit erklären können.

Von oben ist auf den Einfluss der Stärke und des Abstandes des Entladungsstromes hingewiesen worden. Wir betrachten nun weiterhin die Teile des Körpers, durch welche der Strahl durchfährt und nehmen wir hinzu noch die individuelle Anlage des Betroffenen, so scheint mir die Erklärung im Allgemeinen gegeben zu sein.

Setzt, es sei keine Verletzung eingetreten, es habe sich nur ein gewisser Druck, eine Art Beklemmungsgefühl geltend gemacht. Hier ist mit Bestimmtheit zu schliessen, dass der Blitzschlag nicht im Bereich des Entladungsstromes, sondern nur nahe dabei befunden hat. Der Schreck und die Angst sind allein imstande, solche Empfindungen hervorzurufen. Vielleicht sind auch, wenn wirklich ein Schlag

verspürt worden ist, die zur Wirkung gekommenen Strahlenbüschel zu schwach gewesen, nun mehr solchen hervorzurufen

Geringfügige, streng lokalisierte Verletzungen ihre Erklärung in den schwachen zersplitterten Strahlen des elektrischen Stromes, wie wir sie da häufig treffen, wo der Blitz zunächst in einen schlechten Leiter geschlagen hat und dann in Einzelstrahlen auf Wegen in die Erde dringt. Da solche Zweigstrahlen so schwach zu sein pflegen, so bleibt das Allgemeinbewusstsein in der Regel ziemlich ungestört, wiewohl vorübergehende Lähmungen und Anästhesien nicht zu den Seltenheiten gehören. Zur Bewusstlosigkeit kommt es nicht, es kann denn sein, dass die Heftigkeit des Schlages einen Schreck nach sich zieht.

Anders, wenn der Strahl am Kopf ansetzt, wenn das Gehirn in den Strom eingeschaltet ist. Dann tritt sogleich bewußtloser Tod ein, wendigerweise infolge der Störung in der Hirnfunction, als dem Sitz des Bewusstseins sofort Betäubung, und nach kurzer, recht heftiger Entladung der Tod ein.

All diese Störungen, Lähmungen, An- und Parästhesien, sowohl wie Betäubung und auch der Tod sind bei Blitzschlag lediglich Folgen von molekularer Umlagerung im Nervensystem. Wir haben hier einen Vorgang, wie ihn bei den Induktionsströmen im weichen Eisenkern der Elektromagneten wiederfinden.

Recht interessant ist der in der Hallenser medicinischen Beobachtete Fall von Blitzschlag, von dem später noch mehr die Rede sein wird, weiter dadurch, dass die wenigsten verletzten Personen den Donner resp. das dumpfe Gekrach des Entladungsstromes gehört haben, sondern bildet somit einen Beweis gegen die Richtigkeit der Plinius'schen Lehre und noch vielfach verteidigten Plinius'schen Lehre, dass die vom Blitz Getroffenen weder vom Blitz noch vom Donner etwas wahrzunehmen vermögen. Gewiss muss zugestanden werden, dass derjenige niemals etwas von Blitzerscheinungen

ken kann, welcher von dem elektrischen Strom in bester Weise stark betroffen und sofort betäubt wird, solche Fälle bilden nur eine kleine Gruppe; für all dem findet sie keine Bestätigung.

Ist ein Wahrnehmen von Blitz und Donner schon bei der Wirkung sehr gut möglich, so wird diese Möglichkeit zur grössten Wahrscheinlichkeit beim Rückschlag liegt, auch wenn der vom Rückschlag Betroffene betäubt wird, zwischen Entladung der Wolke und eben beim Rückschlag eine Zeitdifferenz, die wohl meistens genügt, um Eindrücke zu hinterlassen. Als Beweis hierfür kann uns der schon erwähnte Fall von Charcot dienen, in dem der Ausgleich zwischen Wolke und Erde in einer Entfernung von kaum 2 m von dem betreffenden Individuum stattgefunden ist. Trotz dieser geringen Distanz und durch den Rückschlag bewirkten unmittelbar folgenden Wirkung vermochte es, Blitz und Donner, ja einen gewissen Geruch wahrzunehmen.

Haben wir bisher nur die unmittelbaren Folgen und Meinungen nach Blitzschlägen behandelt, so fragt es sich nunmehr, wie gestaltet sich das spätere Krankheitsbild, wenn die Betroffenen stärker in Mitleidenschaft gezogen werden.

Um dieser Frage, mit deren Beantwortung man sich Ende der 70er Jahre noch garnicht beschäftigt hatte, näher zu treten, stellte Nothnagel in der Erwägung, ob ja Blitzschläge nichts anderes als starke elektrische Entladungen wären, mit Zuhülfenahme Leydener Flaschen Versuche an. Und hierdurch kam er zu ganz neuen, dahin unbekannten Gesichtspunkten. Das Resultat¹⁾ ungefähr folgendes:

Von Einfluss auf die Wirkung des elektrischen Stromes auf das Tier ist in physikalischen Beziehung die

1) H. Nothnagel: Zur Lehre von den Wirkungen des Blitzes auf elektrischen Körper. Virchow's Archiv Bd. 80 Seite 327.

Stärke des Schlages, die Gesamtdicke des leitenden organischen Querschnittes und das Verhältniss von Knochen zu Weichteilen an den durchschlagenen Partien. Knochen ist ein viel schlechterer Leiter als die weichen Gewebe.

Unter Berücksichtigung dieser Erfahrungen fanden bei direkter Reizung des Nerven eine Herabsetzung der Sensibilität bis zur völligen Anästhesie im Bereich desselben. Diese Störungen sind aber nur funktionell, da sie schnell, in höchstens 1—2 Stunden zurückgehen, ohne nachhaltige Folgen zu hinterlassen. Oft gab das Thier unmittelbar nach dem Schlage durch lautes Schreien eine starke Hyperästhesie zu erkennen, die sich mehrere Stunden später in volle Anästhesie umsetzte; oft trat diese Hyperästhesie erst nach Wiederkehr der Empfindung ein und währte dann längere Zeit.

Die Motilität wurde stets dann am stärksten gestört, wenn der Strom quer durch die Dicke einer Extremität geschickt wurde, am Oberschenkel zum Beispiel vom Nervus ischiadicus zum Nervus cruralis. Hierbei stellten sich immer Paresen ein, die bei grösserer Spannung allmählich in ausgesprochene Paralysen zu Tage treten liessen. Dasselbe Resultat erhielt Nothnagel beim Überleiten von einem Nervus ischiadicus zum andern.

Die motorischen Störungen liefen stets schneller ab als die sensiblen. In den betroffenen Nerven trat eine Verringerung der faradischen Reizbarkeit ein, ein Umstand, den Fontana zu dem jedenfalls etwas kühnen Ausspruch veranlasste: „Die Ursache des Todes bei Blitzschlägen ist der Verlust der Reizbarkeit des ganzen Muskelsystems.“

Und diese Ergebnisse der Nothnagelschen Experimente stehen ganz im Einklang mit den Erscheinungen, wie sie bei Blitzanfällen zu sehen gewohnt sind.

Nur in ganz seltenen Fällen sind anatomische Nervenlähmungen bei diesen Gelegenheiten zur Beobachtung

men. So von Leber¹⁾ und Pagenstecher²⁾ bei seinen Kranken. Bei beiden handelt es sich um Sehstörungen, die sich allmählich nach den Unglücksfällen stellten und das früher völlig normale Sehvermögen auf ein Minimum reduzierten. In dem von Pagenstecher beobachteten Falle kommt eine doppelseitige Katarakt und Verschleierung der Papille zur Ausbildung. Bei dem ersten von Leber untersuchten Patienten gesellte sich zu diesen Erscheinungen noch eine dauernde Mydriasis und vollständige Akkomodationsparese hinzu. Die Entfernung getrübten Linsen brachte in keinem Falle Besserung des Sehvermögens.

Doch solche Beobachtungen sind eben sehr selten; ich glaube, die Zahl derselben ist mit diesen beiden so geringlich erschöpft. In allen andern durch Blitz verursachten Unglücksfällen kommen nur funktionelle Störungen zur Erscheinung. Freilich so einfach, wie die Ergebnisse der Nothgelschen Tierversuche vielleicht glauben machen könnten, liegen die Verhältnisse beim Menschen nicht. Der menschliche Organismus mit seinem äusserst komplizierten und fein gegliederten Nervensystem, mit seiner Psyche reagiert auf heftige Eindrücke, wie Blitzschläge es sind, weit intensiver. Denken wir doch an die nahestehenden Unglücksfälle bei Eisenbahnentgleisungen. Leider sind die bisher bekannt gegebenen Beobachtungen an den durch Blitzschläge Verunglückten zum grössten Teil höchst mangelhaft, dass sie für eine wissenschaftliche Bearbeitung dieses Themas nicht verwertet werden können. Andererseits sind die bisher veröffentlichten ausführlichen und zuverlässigen Berichte zu gering an Zahl, um das Thema erschöpfen zu können. Das, was mir hiervon zugänglich gewesen, will ich nun im Kurzem berichten, um dann hinterher das allen gemeinschaftliche in wenigen Worten zusammenzufassen.

1) Leber: Über Katarakt und sonstige Augenerkrankungen durch Blitzschlag. v. Gräfe's Archiv für Augenheilkunde Bd. 28 Teil 3 Seite 255.

2) Pagenstecher: Augenerkrankungen nach Blitzschlag. Archiv für Augenheilkunde Bd. 13 Seite 146.

Soweit mir bekannt, war Nothnagel¹⁾ auch hier der erste, welcher einen derartigen Fall veröffentlicht hat. Es handelt sich um einen kräftigen Schmied, der im Jahr 1873 vom Blitze getroffen wurde. „Nachdem er 5 Stunden bewusstlos dagelegen hatte, wachte er auf, fühlte sich wohl und munter, konnte aber die rechte Hand nicht bewegen, dieselbe war ganz empfindungslos, fühlte sich kühl an und konnte fast garnicht bewegt werden. Er wurde 10 Wochen lang ohne Erfolg elektrisiert, bis plötzlich unter steter Fortsetzung des Elektrisierens im Verlauf zweier Tage Empfindung und Bewegung wiederkehrte und er dann durchaus gesund und vollständig arbeitsfähig war. Als er 6 Jahre später bei seiner Schmiedearbeit einen Hammer emporheben wollte, war dieselbe Hand plötzlich wieder gelähmt und ebenso empfindungslos wie 6 Jahre vorher. Bei der Aufnahme in die Klinik, die ein Vierteljahr nach diesem Rückfall erfolgte, fand sich rechts eine bedeutende Atrophie sämtlicher Musculi interossei der Muskulatur des Kleinfinger- und Daumenballens. Die Muskeln an der Beugeseite des Vorderarms fühlten sich etwas schlaff an, doch zeigten sie keine Atrophie. Die Muskelbefunde entsprechend fand sich mangelhafte Muskelkraft der rechten Hand. Letztere war in ganzer Ausdehnung völlig anästhetisch. Am meisten charakteristisch war die Begrenzung der Anästhesie. Dieselbe ging ringförmig um die Extremität herum und schnitt mit einer scharfen Linie dicht oberhalb des Handgelenks über beide Processus styloidei der Vorderarmknochen hinweglaufend ab.

Alles dies zusammen, das plötzliche ursächlich nicht zu erklärende Wiederauftreten der Lähmung und Anästhesie, die circuläre Abgrenzung, die bei anatomischer Veränderung der Nerven oder Muskeln niemals eintritt,

1) H. Nothnagel: Zur Lehre von den Wirkungen des Blitzes auf den menschlichen Körper. Virchows Archiv. Bd. 80. Seite 340.

Er machte Nothnagel auf die Vermutung einer sonst kaum ausgesprochenen Hysterie. Eine deshalb eingeschlagene suggestive Behandlung, Anwendung eines Elektromagneten, brachte sofort Heilung und erwies, dass die gestellte Diagnose richtig war. Auffällig war, dass ein sonst gesunder, nervös garnicht belasteter Mann plötzlich hysterische Erscheinungen zeigte

Zwei andere Fälle¹⁾, die dem eben Angeführten nach vielen Seiten hin ähneln, wenn auch die hysterischen Charakteristika nicht so rein und deutlich ausgesprochen sind, werden uns ein Dezennium später aus der Nothnagelschen Klinik in Wien von einem Assistent, v. Frankl-Hochwart, berichtet.

Ein Fall betrifft ein junges Mädchen, das niemals nervöse Störungen gezeigt hat. Während es in einer Küche beschäftigt war, wurde es vom Blitz getroffen. Blitzspuren und Brandblasen setzten rechts hinten am Scheitel an, liefen von dort über die rechte Seite des Halses, über Vorderfläche von Brust und Bauch und zogen sich dann nach der Innenseite der linken Extremität bis zum Fuss hinunter. Nachdem Verletzte zwei Stunden besinnungslos gewesen, empfand sie beim Erwachen nur Schmerzen in den Brandblasen und geringe Schwäche in den Extremitäten. Das Sehvermögen war auf beiden Augen einen Tag lang aufgehoben. Später wurden des Öfteren Doppelbilder gesehen. Erst nach drei Monaten besserte sich der Zustand insoweit, dass Gehversuche gemacht werden konnten. Allmählich nahm die Schwäche ab. Doch bei dem Abgang aus der Klinik war noch immer eine deprimierte Stimmung, eine Verlangsamung der Sprache und Herabsetzung der Kraft zurückgeblieben. Dieser Zustand hielt 5 Jahre an. Nach Verlauf dieser Zeit stellte sich plötzlich Schwindel, Kopfschmerz und Erbrechen ein. Eine nähere Untersuchung ergab Einschränkung des Gesichtsfeldes,

1) L. v. Frankl-Hochwart: Über Keraunoneurosen. Zeitschrift für klinische Medizin. Bd. XIX. S. 315.

geringe halbseitige Hyperästhesie, geringe grobe Kraft und vollständiges Aufgehobensein des Geruchs auf der rechten Seite. Die klinische Behandlung blieb ohne Erfolg.

In dem anderen Falle handelt es sich um einen 58 jährigen Bahnwächter, der bis dahin stets gesund war. Als er während eines heftigen Gewitters den in seinem Wächterhause befindlichen Telegraphenapparat ausschalten wollte, verspürte er einen heftigen Schlag in der rechten Hand. Der Arm sank herab, Patient fühlte, dass ein plötzlicher Schmerz durch seinen rechten Arm und sein rechtes Bein hindurchfuhr. In den ersten Augenblicken konnte er sich nicht von der Stelle rühren, da er das rechte Bein nicht bewegen konnte; er musste sich, um nicht hinzufallen, mit der linken Hand festhalten. Gleich nach dem plötzlichen Schmerz bemerkte er, dass Bein und Hand steif und kalt waren. Schon nach 10 Minuten vermochte er sich jedoch wieder zu bewegen und seinem Dienste nachzugehen. Das Kältegefühl dauerte 3 Tage an und kehrte später 1 2 mal im Monat wieder. 2 Jahre später verschlimmerte sich der Zustand plötzlich derart, dass die Schmerzen in der rechten Extremität sehr stark wurden und Patient sogar den Dienst aufgeben musste. Seit dieser Zeit bemerkte er rechts eine Abnahme des Sehvermögens, Kraftverringerung und äusserst starke Kreuzschmerzen. Täglich traten im rechten Bein Krämpfe auf. Die Untersuchung ergab noch ferner rechts verengte Pupille mit träger Reaktion. Die Gesichtsfelder waren eingeschränkt, es bestand Zungentremor. Rechts war die grobe Kraft bedeutend herabgesetzt. Der Gang war schleppend und langsam, Armbewegung nur mangelhaft. Die klinische Behandlung brachte hier Besserung hervor.

Der Krankheitsverlauf des zweiten Falles zeigt in den ersten Tagen recht schön, wie die Nothnagelschen Tierversuche der Wirklichkeit entsprechen. Zunächst starke Hyperästhesie für ganz kurze Zeit, danach Lähmung und Hyperästhesie und endlich verschwindet die Lähmung früher als die sensible Störung.

In beiden Fällen haben wir Lähmungen traumatischer Natur und beide müssen in die Gruppe der traumatischen Neurosen gebracht werden. Der Beobachter sagt darüber: „Im ersten Falle mag die Benommenheit nach dem Schläge eine unmittelbare Shokwirkung, teils auch durch den Einfluss der Verbrennung entstanden sein. Die später auftretende Lähmung müssen wir schon als funktionell auffassen, da sie sich erst allgemach entwickelte. Hierher gehören auch die zeitweilig auftretenden Doppelbilder und die von der Kranken berichtete halbseitige Abstumpfung des Gefühls. Die geistige Apathie, die tiefe Verstimmung gab so recht das Bild, wie es Oppenheim für traumatische Neurose geschildert hat. Als zur Neurose gehörig, ist noch die Herabsetzung des Geruchs an einer Seite hervorzuheben. Ferner die Hyperästhesie der linken Gesichtshälfte, die Ataxie an der oberen Extremität, das Romberg'sche Phänomen, die Steigerung der Reflexe, die Einschränkung des Gesichtsfeldes“.

Zum zweiten Fall fährt Verfasser fort: „Langsam ganz allmählig entwickelte sich das Bild der traumatischen Neurose. Die rechten Extremitäten, die völlig erstarrt gewesen waren und nur hier und da von Schmerzen ergriffen wurden, bildeten einen *Locus minoris resistentiae*. Es entwickelte sich in ihnen eine gewisse Schwäche, ein leichter Grad von Ataxie; sie sind der Sitz heftiger Schmerzen. Als weitere Symptome, welche unsere Diagnose rechtfertigen, mögen angeführt werden: Kreuzschmerzen, Pupillendifferenz, die ausserordentliche Einschränkung des Gesichtsfeldes, die Steigerung der Reflexe und der Zungentremor“.

Der vierte in der Litteratur verzeichnete Fall dieser Art¹⁾, dessen schon vorher bei Behandlung des Rückenschlages Erwähnung gethan ist, wird von Charcot¹⁾ berichtet. Der Mensch, um den es sich handelt, war stark hereditär

1) J. U. Charcot: *Accidents nerveux provoqués par la foudre*. Leçons du Mardi à la Salpêtrière, Paris 1889 Seite 435.

belastet und durch Unglücksfälle in seiner Familie sowie durch angestrengte Thätigkeit im höchsten Grade nervös geworden. Ja, er war einer schweren Depression verfallen. Als dieser Mensch sich gelegentlich eines Geschäftsganges, der mit vielem Ärger verknüpft war, auf dem Heimwege befand und eine Landstrasse passieren musste, überraschte ihn ein heftiges Gewitter, während dessen ein Blitz ungefähr 300 m. weit von ihm einschlug. Hierdurch geängstigt und stark erregt beschleunigte er seine Schritte. Plötzlich fuhr ein neuer Blitz 2 m von ihm entfernt zur Erde, worauf er dann besinnungslos niederfiel. Doch diese Betäubung trat, wie schon oben ausgeführt wurde, nicht unmittelbar nach der Entladung der Wolke ein, sie wurde erst durch den Rückschlag verursacht. Demnach lagen noch einige Augenblicke zwischen Entladung und Rückschlag; eine Zeitdifferenz, zwar kurz, doch lang genug, um noch ein gut Teil des elementaren Vorganges wahrnehmen zu lassen. So erinnerte sich denn der Betroffene später noch genau der Einzelheiten. Der Blitz, der in Gestalt einer stark glänzenden Feuerkugel von der Grösse eines 50 cm langen Bierfässchens zur Erde niederkam und nach Berührung der Erde drei dichte Qualmwolken von erstickendem Geruch aufwirbeln liess, verursachte ein so gewaltiges Getöse, als ob der Donner vieler Kanonenschüsse noch durch das Geklirr von tausend zu Boden fallenden Schüsseln verstärkt würde. Erst hierauf verspürte er einen heftigen Schlag und danach hörte die Erinnerung auf. Nachdem er ungefähr zehn Minuten in dem Betäubungszustande gelegen hatte, wachte er auf. Beim Versuch, sich zu erheben, fehlte ihm die hierzu erforderliche Fähigkeit. Erst nach dreimaligem Bemühen gelang es ihm, eine sitzende Stellung einzunehmen. Hierüber voller Angst und aus Furcht vor schlimmen Ausgang fing er, dessen Gemütszustand schon an und für sich krankhaft erregt war, zu weinen an. Erst als er sich überzeugte, dass er keinen sichtbaren Schaden genommen,

fasste er wieder Vertrauen. Ja nach längerer Anstrengung vermochte er sich aufzurichten und schleppte sich trotz hochgradiger Parästhesie und Parese des linken Beines noch einen Kilometer dahin. Instinktiv und noch ganz unter dem Druck des eben Erlebten begab er sich zu einem am Wege wohnenden Freund. Hier kam er bleich, zitternd, verwirrt und mit den Zeichen höchster Aufregung an, so dass er auf Fragen keine Antwort gab und nur unzusammenhängende Laute ausstiess. Sein ganzes Denken war, wie aus einzelnen Worten zu entnehmen, von dem letzten Ereignis in Anspruch genommen. In diesem Zustande wurde er nach seiner Wohnung gebracht, wo sich bis zum nächsten Morgen nichts in seinem Befinden änderte: Er weinte, schrie, sah den Blitz, hörte den Donner und warf sich unruhig im Bette umher. Erst allmählich wurde er für seine Umgebung empfänglich. Die Parese sowie das Taubsein der getroffenen linken Seite währte aber fort, nahm jedoch nicht zu. Eine Verschlechterung trat erst durch Berichte seines Beichtvaters von verschiedenen tödtlichen Ausgängen nach Blitzschlägen ein, der ihm im Hinblick auf diese zeigen wollte, einem wie schlimmen Verhängnis er entgangen wäre. Doch dieser Trost wurde ihm zum Unheil. Er, der sich eben von dem Bann, unter dem er gewissermassen gestanden, losgerungen hatte, wurde nur noch weit intensiver auf sein Unglück hingelenkt. Durch eine Art geistigen Wiederkauens, wie Charcot sich sehr zutreffend ausdrückt, versetzte er sich auf dem Wege der Autosuggestion in einen hysterischen Zustand. Die linksseitige Parese wurde zur Paralyse und die entsprechende Hyperästhesie steigerte sich zur Anästhesie. Von Zeit zu Zeit wiederholten sich die hysterischen Anfälle in ziemlich gleich bleibender Heftigkeit, stets von Jammern, Weinen, Augenverdrehen begleitet und unter den Zeichen der höchsten Angst. Da das Krankheitsbild sich nur wenig veränderte, so kam Patient in klinische Behandlung. Und hier fand man neben den genannten

hysterischen Erscheinungen noch weitere diesbezügliche Symptome, wie linksseitige Herabsetzung des Gehörs, Geruchs, Geschmacks, linksseitige Pharynxanästhesie, Gesichtsfeldeinschränkung, monokuläre Diplopie, Zungentremor, Lippenspasmus und nervöse Dyspepsie. Die hysterischen Anfälle kehrten öfter wieder und konnten jeder Zeit durch Druck auf gewisse Punkte künstlich hervorgerufen werden. Eine suggestive Behandlung brachte in verhältnismässig kurzer Zeit ziemlich gute Besserung.

Nehmen wir die eben geschilderten Erscheinungen zusammen, verfolgen wir das Entstehungsbild der Krankheit, die ursprünglich geringfügige Störung, die Steigerung der Parese und Hyperästhesie zur Paralyse und Anästhesie durch psychische Eindrücke, die verschiedenen Einzelanfälle, die Points, die specifisch hysterischen Störungen der Sinnesorgane, das Halbseitige der Affektion, die günstige Wirkung der Suggestion. kurz alles dies und ähnliches zusammen, so haben wir ein Krankheitsbild, das nur mit dem Namen Hysterie bezeichnet werden kann.

Charcot selbst erklärt sich diese Hysterie dadurch, dass er eine gewisse Disposition bei dem in Rede stehenden Patienten annimmt und die vorübergehende körperliche Paralyse, welche sich nach dem Blitz einstellt, als ursächlich zur Enthüllung einer bis dahin verdeckt gebliebenen Hysterie hinstellt. Er sagt: *Mon opinion est, qu'il y a eu véritablement chez notre sujet, au moment même, où il dit avoir ressenti le coup, paralysie par fulguration, et c'est sur cette paralysie que ultérieurement la paralysie hystérique est venue se greffer. Puis à la faveur de l'état préexistant de neurasthénie cérébrale, créé par des chagrins et un surménage recente, l'hystérie s'est bientôt développée sans l'influence de la commotion physique et de l'ébranlement psychique que l'a accompagnée. celles-ci jouant, par rapport à la névrose, la rôle d'agents provocateurs.*

Gleichzeitig mit diesem Bericht bringt Charcot in kurzen Worten noch eine sehr interessante Beobachtung

eines anderen französischen Arztes, die im Jahre 1881 von Gibier de Savigny in der Zeitschrift „La revue médicale“ wiedergegeben ist. Leider ist mir diese Schrift nicht zugänglich gewesen und begnüge ich mich deshalb mit dem kurzen Bericht von Charcot. Es handelt sich um einen 28jährigen Krankenwärter. Der Blitz schlug auf 10 m. Entfernung von diesem Mann in eine Steinmauer. Sofort brach er bewusstlos zusammen. Als er nach einer halben Stunde erwachte, blutete er stark aus Nase, Mund und Ohren, ohne durch abgesprengte Mauerstücke beschädigt zu sein. Der rechte Arm war gefühllos und gelähmt. Bald stellte sich Besserung ein und Patient wurde abgesehen von dem Umstande, dass man jeder Zeit künstlich hysterische Anfälle hervorrufen konnte, als geheilt entlassen.

Dies und die Thatsache, dass sich während kommender Gewitter die Erscheinungen zu wiederholen pflegten, um dann nach Aufhören der Unwetter völlig zu verschwinden, sprechen zu sehr für Hysterie, als dass es einer weit-schweifigen Begründung bedarf.

Nachdem ich so die bisher in der Litteratur bekannten Fälle dieser Art zum grössten Teil angeführt und in Kurzem besprochen habe, ist es nötig, auf die Entwicklung dieser Krankheitsbilder näher einzugehen.

Überall setzt die Affektion urplötzlich ein. Die Kranken werden zunächst gelähmt oder doch paretisch und in ihrer Empfindungsfähigkeit gestört. Doch diese Affektion ist in der Regel nur ganz flüchtiger Natur, sie würde bald ganz verschwinden, wenn nicht eine gewisse psychische Veränderung durch den Schreck und durch den Unfall, der für die Zukunft fürchten lässt, hervorgerufen würde. Die Kranken beschäftigen sich mit ihrem Unglück so intensiv, dass andere Gedanken gar nicht Platz greifen können, sie empfinden, denken und fühlen anders als früher. Sie haben einen *Locus minoris resistentiae*, auf dem sich die verschiedensten Krankheitsbilder der sogenannten traumatischen Neurose, Neurasthenie, Hypochondrie und

Hysterie aufbauen können. Je nach der Intensität der Störungen und dem Herorstecken einzelner Symptome sowie besonders einer ganzen Gruppe von Symptomen haben wir es mit einer der erwähnten Neurosen zu thun. Bei allen sind Störungen im Ablauf der seelischen Prozesse eingetreten. Im einzelnen unterscheiden sie sich wohl dadurch, dass bei der Neurasthenie die krankhaften Empfindungen weniger spontan auftreten, sondern verhältnismässig unbedeutende Reize oder Anstrengungen sie hervorrufen. Bei der Hypochondrie ist die Aufmerksamkeit anhaltend oder doch vorwiegend auf die Zustände des eignen Körpers gerichtet und das Stimmungsbild ein depressives. Bei der Hysterie ist die Depression nicht immer, obwohl häufig vorhanden. „Bei ihr ist, um mich der Worte Strümpell's¹⁾ zu bedienen, die Beziehung zwischen den geistigen Vorgängen und der Körperlichkeit so sehr ins Schwanken geraten, dass eine völlige Lockerung (Lähmung, Anästhesie) dieser Beziehungen oder unter dem Fortfall alle gesunden geistigen Hemmungen ganz abnorme geistige Reizzustände entstehen“. Letztere entwickelt sich, indem die Psyche mehr und mehr mit Eindrücken angefüllt wird, die ein Abbild von dem vermeintlichen Zustände des Körpers geben. Und so werden die pathologischen Vorgänge immer ausgeprägter. Die subjektiven Beschwerden nehmen zu, starke Reizerscheinungen, Schlaflosigkeit, Zittern, Spannungszustände und all die andern Symptome nehmen grösseren Umfang an. Wir haben es mit einer, wie Charcot sagt, richtigen Autosuggestion zu thun.

Natürlich treten die Krankheitsbilder nicht immer ganz so rein auf, wie eben geschildert ist. So sehen wir in einzelnen der vorher berichteten Fälle, wie namentlich dem ersten v. Frankle-Hochwart'schen sowohl neurasthenische wie hysterische Symptome. Zumeist aber tritt

1) A. Strümpell: Neurasthenie im Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten, Auflage VII Band II. Teil I Seite 541.

die Hysterie klar zu Tage. In einigen Fällen, wie besonders bei dem von Charcot beobachteten Patienten, existiert schon lange vor dem Blitzschlag eine nervöse Disposition, auf deren Boden dann die Hysterie leicht zur Entwicklung kommt. In der grösseren Zahl der Beobachtungen wird nervöse Belastung direkt in Abrede gestellt. Der psychische Shok genügt, um ein so kompliziertes Krankheitsbild wie die Hysterie hervorzuzaubern.

Und dass der psychische Shok für die Fortentwicklung langwieriger Krankheiten in Frage kommt, das geht aus den bei Eisenbahnunglücksfällen gemachten Beobachtungen hervor. Oppenheim berichtet von Kopfverletzungen, infolge deren sich motorische Störungen nicht auf der der afficierten Seite gegenüberliegenden Körperhälfte einstellten, wie wir es infolge der Pyramidenkreuzung erwarten sollten, sondern auf derselben Seite.

Nachdem ich im Vorhergehenden die wichtigsten von den bisher in der Litteratur verzeichneten Krankheitsfällen nach Blitzschlag angeführt habe, möchte ich hier an letzter Stelle noch einen Fall wiedergeben der in diesem Jahre in der Kgl. Nervenlinik des Herrn Geheimrat Prof. Dr. Hitzig zur Beobachtung gelangt ist.

Von den physikalischen Erscheinungen und anderen mitbetroffenen Personen ist schon vorher verschiedentlich gesprochen worden. Hier will ich nur auf das Krankheitsbild eingehen, das uns an meisten interessiert.

Anamnese: August K. 28 Jahr alt, Bergmann aus der Nähe von Halle Patient ist hereditär nicht belastet. Abgesehen von einigen unbedeutenden Krankheiten, die hier nicht von Interesse sind, ist er stets gesund gewesen. Im Jahre 1888 hat er sich während seiner Militärzeit durch Zugluft angeblich eine Erkältung zugezogen, auf die er noch jetzt bestehende geringfügige Zuckungen im rechten Arm zurückführt. Die Zuckungen sind nicht fortwährend zu beobachten, sie treten nur im Schlafe auf.

Am 20. Mai dieses Jahres abends 6 Uhr wurde Patient

in der oben geschilderten Weise vom Blitz getroffen. Er fiel sofort besinnungslos um und röchelte. Die Hautfarbe war totenblass, die Extremitäten kalt und bläulich verfärbt. Lebhaftes Zucken namentlich in Brust- und Armmuskulatur machten sich beiderseits bemerkbar. Sie traten in rascher Folge abwechselnd rechts und links auf und waren so heftig, dass der ganze Oberkörper nach der betreffenden Seite herumgerissen wurde. Die Augen waren so stark verdreht, dass nach Angabe der Angehörigen nur „das Weisse“ zu sehen war. Ein nach einer Viertelstunde hinzugekommener Arzt änderte durch Chloroform und subkutane Maximaldosen von Morphinum auffallend wenig, nur die abnorme Augenstellung wurde durch das Chloroform aufgehoben. Schmerzenslaute, die Patient fortwährend ausstieß, bestanden in einem monotonen „Au“. An ihn gerichtete Fragen wurden nicht beantwortet. Erst nach 1—1½ Stunden schien der Patient das Bewusstsein wieder zu erhalten; gestellte Fragen schien er teilweise zu verstehen, vermochte sie aber nicht zu beantworten. Die Augen waren starr nach vorn gerichtet. Zwei Tage lang lag er in diesem traumartigen Zustande. Am dritten Tage verstand er die an ihn gerichtete Worte; der Blick wurde freier. Wenn er sprechen wollte, musste er verschiedene Male ansetzen, liess dann Buchstaben aus und verschluckte ganze Sätze. Er erinnert sich aus den ersten Tagen, viel und laut geschrien zu haben. Von Blitz und Donner hat er nichts wahrgenommen. Am auffallendsten war dann in den ersten 8 Tagen, dass er des Morgens kurz nach dem Erwachen ganz ausser Stande war, überhaupt Töne hervorzubringen. Doppelbilder, die er zunächst fortwährend gesehen haben will, traten jetzt nur selten auf. Dabei bestand auf der ganzen linken Seite eine starke Hyperästhesie, namentlich aber im Arm, so dass jeder Annäherungsversuch ängstlich abgewehrt wurde. Gegen die Einstiche der Injektionsspritze auf dieser Seite war er hingegen völlig unempfindlich. Allmählich besserte

sich der Zustand, die Schmerzen liessen nach, die Krämpfe und Zuckungen wurden schwächer und es traten zunächst kürzere, dann längere krampffreie Intervalle ein. In den ersten zehn Tagen musste dem Patient wegen allzugrosser Schwäche und starken Intentionszitterns die Nahrung gereicht werden. Es fiel auf, dass er die grössten Bissen ohne Beschwerden verschlucken konnte. Inzwischen verliess er schon des Öfteren das Bett, doch fühlte er sich sehr matt und hatte „kein richtiges Gefühl am ganzen Körper“. Allein konnte er noch nicht gehen und stehen, er verspürte nicht, dass er mit den Füßen auftrat, es kam ihm vor, als ob er auf etwas Weiches träte. Die Zuckungen und Schmerzen, die sich nur noch hin und wieder am Tage einstellten, steigerten sich stets des Abends, sobald er in das kalte Bett gebracht wurde. Allmählich vermochte er auch kürzere Strecken allein zu gehen.

In diesem Zustande kam er am 6. Juni, also 16 Tage nach dem Unfall, in die hiesige Klinik, nachdem sich noch Abends zuvor infolge eines Gewitters die Schmerzen und Zuckungen so gesteigert hatten, dass er — um mich seiner Worte zu bedienen — „im Bette umherwühlte“.

Status praesens: Patient ist ein blasser, schlanker, mässig genährter Mann mit leicht deprimiertem Gesichtsausdruck. An der linken Schläfe sieht man eine unregelmässig begrenzte Rötung, die Haut der linken Wange und der gleichnamigen Halsseite ist leicht diffus gerötet. Ein breiter braunroter Streifen, welcher am Sternum entlang geht, nimmt die ganze Breite desselben ein. Von da an setzt er sich nach abwärts fort und zwar in senkrechter Richtung bis handbreit unterhalb des Processus ensiformis mit etwas diffusen Grenzen. Dann wendet er sich nach links, schneidet die linke Leistengrube ungefähr in der Mitte, geht auf die Vorderfläche des linken Oberschenkels über und endet hier etwas unterhalb des oberen Drittels. Die Ränder dieses breiten Streifens sind namentlich vom Nabel an abwärts mit braunem Pigmentsaum eingefasst.

Eine dunkle etwas über Fünfmarkstück grosse Stelle befindet sich handbreit über der linken Patella. Der Unterschenkel ist frei von jeder Spur. Auf der Mitte des Aussenrandes beider Fusssohlen sind Fünfzigpfennigstück grosse exkorierte Hautpartieen, welche rechts tiefer gehen als links und schlecht granulierende Oberflächen besitzen. Am Innenrande der ersten Phalanx der zweiten linken Zehe befindet sich ein rotes 1 cm breites Narbenband von oberflächlicher Exkoration herrührend.

Die Pupilien sind gleich weit und reagieren prompt auf Lichteinfall. Die Augenbewegungen sind nicht behindert, wohl aber ist die Akkomodation stark geschwächt. Beim Fixieren tritt geringe Convergenzbewegung beider Augen ein. Auf beiden Augen besteht bei seitlicher Blickrichtung monokuläre Diplopie. Die ophthalmoskopische Untersuchung ergibt negative Resultate.

Geruch und Geschmack ist beiderseits erhalten.

Das Gehör ist auf beiden Ohren herabgesetzt. Alte Narben und Kalkablagerungen auf den Trommelfellen weisen auf ausgeheilte Ohrenerkrankungen hin und sind die Gehörsstörungen zum Teil wohl hierauf zurückzuführen.

Facialis: Das Stirnrunzeln ist beiderseits gering und ungeschickt, doch gleich.

Der Schluss der Augen verursacht Tremor der oberen Lider.

Beim Zähnezeigen ist die linke Nasenwangenfalte stärker ausgesprochen als rechts.

Trigeminus: Die motorischen und sensiblen Bahnen sind intakt. An den Austrittsstellen ist keine Druckempfindlichkeit vorhanden.

Die Zunge ist frei beweglich und zeigt keine Abweichungen beim Herausstrecken. Nur in der Spitze sieht man schwache fibrilläre Zuckungen. Sprache langsam, doch gut.

Am weichen Gaumen und der hinteren Rachenwand werden links Pinselberührungen fast garnicht gefühlt,

Nadelstiche schwach empfunden. Schluckreflexe werden bei Berührung nur rechts ausgelöst.

Motilitätsprüfung an den Extremitäten:

Obere Extremitäten: Die Motilität ist intakt, nachdem zuerst der Patient sich bei aufgegebenen Bewegungen sehr ungeschickt angestellt hat, und auch jetzt ist er noch nicht imstande, die Hände sicher nach vorn auszustrecken. Die grobe Kraft ist bedeutend herabgesetzt. Dynamometer zeigt rechts 10 kgr. links 5 kgr.

Untere Extremitäten: Die Motilität ist auf beiden Seiten gleich. Grobe Kraft ist erhalten. Ein geringes Hinken beruht auf den Geschwüren an den Füßen.

Sensibilität: Links und zwar auf Brust und der ganzen oberen Extremität werden Nadelstiche und Pinselberührungen sowie Temperaturverschiedenheiten weniger empfunden als rechts.

Die Patellarreflexe sind etwas gesteigert, links sind sie schwächer als rechts. Hautreflexe wenig lebhaft.

Points: Jugulum und beide Supraclaviculargruben sind äusserst empfindlich.

Durch stärkeren Druck auf beide Bulbi gelingt es, einen hysterischen Anfall auszulösen. Der Patient jammert, schüttelt den Kopf taktmässig und trommelt dabei mit den Ellenbogen auf die Unterlage, schlägt zuletzt auch mit den Füßen. Durch starken Druck auf die Unterbauchgegend wird der Anfall coupiert.

Bei einem zweiten Anfall werden beiderseits schnelle Beuge- und Streckbewegungen mit den Unterarmen gemacht.

Diagnose: Hysterie nach Blitzschlag.

Prognose: Zweifelhaft.

Therapie: Jeden Tag kalte Abreibungen, jeden 2. Tag ein elektrisches Bad (Suggestion: Patient wäre durch Elektrizität verunglückt und müsste nun wieder durch Elektrizität geheilt werden). In den ersten Tagen, sobald Schlaf schlecht ist, wird 1 gr. Phenacetin verabreicht.

7. VI. Die Sensibilitätsstörungen haben stark abgenommen, Patient fühlt auch an der hinteren linken Pharynxwand. Schluckreflexe werden links noch nicht ausgelöst. Die rechtsseitige monokuläre Diplopie ist fast ganz verschwunden, links noch erhalten. Akkomodation heute gut. Der Gang ist derselbe wie Tags zuvor. Durch Druck auf beide Bulbi wird unter geringer Suggestion ein hysterischer Anfall ausgelöst, der dem ersten vom vorigen Tage völlig gleicht.

8. VI. Patient bekommt morgens ein elektrisches Bad. Der Zustand ist derselbe wie Tags vorher, nur die Zuckungen sind schwächer geworden.

9. VI. Nachts sehr starke Schmerzen in beiden Schultern und Oberarm, die bis zu den Ellenbogen ausstrahlten. Abends 1 gr. Phen.

10. VI. Schlaf gut, Schmerzen gering. Die Sensibilität ist wieder vollkommen vorhanden. Im Laufe des Tages ein elektr. Bad.

11. VI. Schlaf ist leidlich gewesen. In der linken Schulter geringe Stiche.

12. VI. Des Nachts ist Patient wegen heftiger Schmerzen in Schultern und Arm öfters erwacht. Am Morgen dauern die Schmerzen fort und werden, obgleich nach dem elektrischen Bade einige Stunden Besserung vorhanden, später krampfartig stechend. Grund: Gewitterartiger starker Platzregen.

13. VI. Bedeutende Besserung. Die Schmerzanfälle kommen selten; Patient fühlt sich kräftiger. Die Geschwüre an den Füßen sind beinahe verheilt, weswegen der Gang nicht mehr hinkend. Dynamometer: R 27 L 23 kg.

14. VI. Tremor der Lider ist verschwunden. Schlaf ist gut gewesen. Ein hysterischer Anfall kann nicht mehr hervorgerufen werden. Morgens 1 elektr. Bad, abends wegen Schmerzen 1 gr. Phen.

15. VI. Schlaf auch heute gut. Am Tage noch immer Schmerzen.

16/VI. Schmerzen am Tage stärker wie zuvor. Morgens 1 Bad, abends 1 gr. Phen.

17/VI. Schlaf sehr gut. Grobe Kraft zur Norm zurückgekehrt. Aussehen freier wie je zuvor. Allgemeinbefinden gut.

18/VI. Befinden gut. 1. Bad.

20/VI. Besserung dauert fort.

25/VI. Patient fühlt sich völlig genesen, nur noch rechts ein wenig Schmerz.

27/VI. Zustand wie 2 Tage vorher.

3/VII. Patient wird als geheilt entlassen.

Wir sehen, die Krankheit läuft ohne jede Störung ab. In dem kurzen Zeitraum von $1\frac{1}{2}$ Monaten ist Patient vollständig wieder hergestellt: ein Beweis, dass wir es hier auch nicht mit der geringsten anatomisch Läsion des Nervensystems zu thun gehabt haben. Hier leuchtet uns das Bild der Hysterie so deutlich und klar entgegen, wie wir es nicht einmal in dem Falle von Charcot gesehen haben. Gleich nachdem der Patient das Bewusstsein zurückerhält, ist er auf das Eifrigste und Peinlichste bemüht, jede Berührung seines Körpers abzuwehren, während er doch in der That das Stechen mit der Injektionsspritze garnicht empfindet. Die Störungen in Motilität und Sensibilität beschränken sich auf die linke obere Körperhälfte sowohl im Gebiet des Facialis und Plexus brachialis wie im Verlauf des N. trigeminus. Und diese Störungen sind so spezifisch für Hysterie, dass die Diagnose schon allein daraus gestellt werden könnte. Nimmt man hierzu noch die Ent- und Abwicklung der Krankheit, den plötzlichen Wechsel im Wohlbefinden des Patienten zu Hause und in der Klinik, das künstliche Hervorrufen hysterischer Anfälle, so tritt jeder Zweifel zurück.

Und so bildet denn der eben angeführte Fall eine neue Beigabe zu dem geringen Material, das bisher über Blitzunfälle und ihre weiteren Folgen bekannt ist. Auch

Lebenslauf.

Verfasser, Maximilian Victor Plothe, evangelischer Konfession wurde geboren am 16. Januar 1868 zu Schwerin a/Warthe, Provinz Posen, als Sohn des Gutsbesitzers Wilhelm Plothe. Seine Schulbildung erhielt er zunächst auf der Vor- und Höheren Knabenschule seiner Vaterstadt, dann auf den Kgl. Gymnasium zu Deutsch-Krone, das er Ostern 1889 mit dem Zeugnis der Reife verliess. Danach studierte er in Halle Medizin. Nachdem er hier am 4. März 1891 das Tentamen physicum bestanden und im Sommer desselben Jahres seiner Dienstpflicht mit der Waffe genügt hatte, wändte er sich, um sein medizinisches Studium fortzusetzen, im Winter 1891/92 nach Berlin, im folgenden Semester nach München. Wintersemester 1892/93 kehrte er nach Halle zurück. Hier bestand er am 4. November 1893 das Examen rigorosum.

Während seiner Studienzeit hörte er die Vorlesungen folgender Professoren und Dozenten:

In Berlin:

v. Bardeleben, Güterbock, Klemperer, Liebreich, Virchow.

In München:

Bollinger, Posselt, v. Winckel, v. Ziemssen.

In Halle:

Ackermann, Bernstein, v. Bramann, Bunge, Eberth, Eisler, Grenacher, Harnack, v. Herff, v. Hippel, Hitzig, Kaltenbach, Knoblauch, Kraus, v. Mering, Oberst, Pott, Renk, Schirmer, Schwartz, Volhard, Weber, Welcker, Wollenberg.

Thesen.

I.

Die durch Blitzschlag verursachten nervösen Störungen sind fast ausnahmslos funktioneller Natur.

II.

Hasenschartenoperationen sollen im Allgemeinen möglichst frühzeitig vorgenommen werden.

III.

Bei schweren Fällen von Chorea während der Schwangerschaft ist künstliche Unterbrechung der Gravidität stricte indiciert.
